

Get Protected

Thông tin về vắc-xin cúm



Tại sao tôi nên chích vắc-xin cúm?

- Cúm là một loại cảm lạnh do vi-rút cúm (influenza) gây ra
- Cúm rất dễ lây từ người khác và chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ bị cúm trong năm nay
- Cúm có thể làm cho một số người bị bệnh rất nặng
- Vắc-xin cúm có thể giúp bảo vệ quý vị và những người khác không bị bệnh
- Bất kỳ ai trên 6 tháng tuổi đều có thể chích vắc-xin cúm

Tôi có thể chích vắc-xin cúm như thế nào?

- Quý vị có thể được bác sĩ, dược sĩ, trung tâm y tế cộng đồng hoặc dịch vụ y tế thổ dân chích vắc-xin cúm cho
- Một số dịch vụ có thể đến chích vắc-xin tại nhà hoặc nếu quý vị sống tại nơi ở được hỗ trợ
- Một số người có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm và hội đủ điều kiện chích vắc-xin cúm miễn phí



Trẻ em dưới 5 tuổi



Người lớn trên 65 tuổi



Người thổ dân Úc



Phụ nữ đang mang thai



Những người có các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tiểu đường



Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Gọi Loddon Mallee Public Health Unit: 1800 959 400

Nói chuyện với người hỗ trợ hoặc bác sĩ của quý vị

Tôi nên chích vắc-xin cúm khi nào?

- Quý vị nên chích vắc-xin cúm hàng năm
- Tốt nhất là chích vắc-xin cúm trước mùa đông, nhưng quý vị có thể chích bất kỳ thời điểm nào trong năm
- Có thể chích vắc-xin cúm cùng lúc với vắc-xin COVID-19 một cách an toàn

Vắc-xin cúm có tác dụng phụ nào không?

- Một số người có thể cảm thấy không khỏe sau khi chích bất kỳ loại vắc-xin nào, đây được gọi là tác dụng phụ
- Hầu hết các tác dụng phụ đều rất nhẹ và kéo dài 1 hoặc 2 ngày
- Một số tác dụng phụ bao gồm:
 - Cảm thấy mệt mỏi hoặc đau nhức
 - Đau ở cánh tay nơi quý vị chích vắc-xin
- Quý vị không thể bị nhiễm cúm từ vắc-xin cúm

